

Fytofotodermatitída

Postihnuté miesta sa ťažko hoja, dlhodobo pretrvávajú výrazná pigmentácia kože.

Kožná reakcia, pri ktorej koža sčervenie, svrbí a tvoria sa pľuzgiere.

Vzniká súčasne po kontakte kože s fotosenzitívnymi látkami rastlinného pôvodu a slnečného žiarenia.

Ohrození nie sú len alergici.

Podporným faktorom je vlhká koža v dôsledku kúpania alebo potenia sa v letnom období.

Najčastejším vyvolávateľom na lúčach je Boľševník obrovský.

Klinické príznaky sa objavujú približne do 24 hodín v mieste kontaktu.

Ako predchádzať fototoxickému kožnému reakcii?

- ✓ Po krájaní citrusov si z rúk opláchnite citrusovú šťavu skôr, ako pôjdete na slnko.
- ✓ Pri práci v záhrade sa chráňte rukavicami, nebezpečný je zeler petržlen a mrkva.
- ✓ Počas prechádzky po lúke si chráňte kožu nôh dlhými nohavcami.
- ✓ Po kúpaní v prírodných jazerách si nelíhajte do trávy.
- ✓ Mnohé kozmetické prípravky s obsahom éterických olejov a liečivá, majú fototoxický potenciál - zvyšujú vnímavosť kože na UVA žiarenie.